

NICOGOM

Tabaquismo

Testimonios elocuentes de nuestro medio que superaron la adicción

*“Volviendo a vivir
lo que nos perdimos”*



NICOGOM

Tabaquismo

Testi



Walter

Me siento bien, duermo mejor, me despierto más temprano con más ganas.



Daniel

Sentirme mas libre, disfrutar de otras cosas, comer, caminar hacer otras cosas sin estar dependiendo de un cigarrillo.

Dejar de fumar, nos cuentan que sienten luego del gran cambio



Sharlene

Poder dejar de fumar, poder dejar algo que me ataba, el vicio y la dependencia actuó sobre mi autoestima.



Mercedes

Me siento estupenda, es más, puedo correr. ¡Hoy corrí!
Ya puedo sentir los olores.



Estela

Me siento bárbara más que nada desde el punto de vista emocional.



Julio

Nos fue muy bien con el sistema de chicles.
Mejóro el relacionamiento con la gente.



Planta Farmacéutica
y producto aprobados
por FDA (USA)



NICOGOM

Composición: cada chicle contiene 2 o 4 mg de resinato de nicotina

Acción Terapéutica: Tratamiento de Reemplazo Nicotínico (T.R.N.) para deshabituación tabáquica.

Indicaciones: Para el tratamiento del Tabaquismo en fumadores nicotino-dependientes a través de la sustitución de nicotina, para mitigar los síntomas de abstinencia, evitando al organismo la incorporación de miles de toxinas producidas por la combustión del papel y del tabaco. Efectivo para Tratamiento de Cesación en períodos de hasta 6 meses, duplica la posibilidad de lograr abstinencia.

Forma de uso: Cada vez que sienta deseos de fumar, se debe masticar suavemente, para que la nicotina se desprenda lenta y progresivamente. Debe masticarse unas diez veces hasta sentir el gusto a nicotina y luego dejar reposar bajo la lengua o labio uno o dos minutos hasta que el sabor prácticamente desaparezca. Repetir el procedimiento durante unos treinta minutos. La sensación de alivio aparecerá entre 15 a 30 minutos de iniciada la masticación. Para una mejor absorción de la nicotina, se recomienda evitar el consumo de café, jugos o gaseosas 15 minutos antes y después de masticar el chicle.

Posología:

Adolescentes: de acuerdo a recomendación médica.

Adultos: cada vez que siente deseos de fumar, hasta un máximo de 20 chicles diarios.

NICOGOM 2mg: se sugiere utilizar esta presentación para fumadores de hasta 20 cigarrillos diarios.

NICOGOM 4mg: se recomienda su uso para fumadores de más de 20 cigarrillos diarios y para aquellos con más de 8 puntos en la Escala del Test de Fagerström.

Contraindicaciones: alteraciones del sistema cardiovascular, angina pectoris, IAM reciente. AVE reciente. Alteraciones tiroideas, trastornos hormonales, embarazo, lactancia. Trastornos gastrointestinales. Trastornos de la tiroides, alteraciones del sistema hormonal.

Presentaciones: envase conteniendo 36 chicles de 2 y 4 mg.



www.fumadorcero.com.uy

 /FumadorCero

Seguinos en Facebook



Servicio a la Comunidad
www.cap.com.uy



**LABORATORIOS
HAYMANN S.A.**

www.haymann.com.uy

Tel: 2924 5000